

エンブレルの治療を受けている患者さんへ

副作用は、早期に発見し、早期に適切な治療をすれば重症化を防ぐことができます。エンブレル投与中に「おかしいな？」と思うことがあったら、すみやかに主治医もしくは看護師、薬剤師にお申し出ください。とくに下記のような症状があらわれた場合は、次の診療日を待たず、すぐに主治医もしくは看護師、薬剤師にご連絡ください。

- 風邪っぽい
- 熱っぽい、熱がある
- 咳（からせき）、痰が出る
- 息切れや息苦しさがある
- のどが痛む
- 発疹がでた
- 疲れやすく、だるさを感じる
- 皮膚にかゆみがある
- 口内炎がよくできるようになった
- 皮膚や白目が黄色くなった



予想されるおもな副作用

1. **注射部位反応** 注射した部分が赤くなったりすることがあります。多くは一時的に発現するものなので、しばらくすると治りますが、症状がでた場合は必ず主治医に報告してください。



2. **感染症** TNFには、体を細菌などの病原体から守るはたらきがあります。エンブレルを投与してTNFのはたらきを抑えると、免疫のはたらきが低下し感染症にかかりやすくなることがあります。臨床試験では、上気道感染や副鼻腔炎（ふくびくうえん）など、カゼのような症状が多くみられています。

