

# 院 外 処 方 箋

(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)

患者番号	9997812	医療機関	旭川医科大学病院
フリガナ	テスト ヤマカ12	住所	旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号
氏名	テスト 山中12	電話番号	(0166) 65-2111
生年月日	昭60年01月01日	保険医氏名	NEC 循環医
年齢	35歳10ヶ月	性別	男
		発行科名	糖尿病内科

被 保 険 者	都道府県	0	1	点数表	1	医療機関	8	0	1	0	2	1	4
公費負担者番号	保険者番号												
公費負担医療の受給者番号	被保険者証 被保険者手帳の 記号・番号	記号 番号											
交付年月日	2020/11/11	処方箋の 使用期間				年 月 日							特に記載のある場合を除き、 交付の日を含めて4日以内に 保険薬局に提出すること。

変更不可

個々の処方薬について、後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。

処 方

Rp. 01	バルサルタン口腔内崩壊錠 40mg	1回 2錠	(1日 2錠)
	1日1回 朝食後		1 4日分
02	ファモチジン散「トワ」 100mg/g	1回 0.1g	(1日 0.2g)
	1日2回 朝食後・夕食後		1 4日分
03	ミグリトール口腔内崩壊錠 50mg	1回 1錠	(1日 3錠)
	1日3回 朝食前・昼食前・夕食前		1 4日分
04	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	1回 1mL	(1日 3mL)
	蒸留水(内用)	1回 9mL	(1日 27mL)
	1日3回 朝食後・昼食後・夕食後		7日分
05	インスリン グラルギンBSリハソ	2本	
	1日1回		
	寝る前 30単位		
06	アセトアミノフェン錠 500mg	1錠	
	痛い時		1 0回分
07	プレドニゾロン錠 2.5mg	用法コメント参照	(1日 6錠)
	朝 3錠、昼 2錠、夕 1錠		
	1日3回 朝食後・昼食後・夕食後		1 4日分

-----<以下余白>-----

保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応（特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。）  
 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤  保険医療機関へ情報提供

備考


保険医署名 「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載した場合は、署名又は記名・押印すること。

調 剤 済 年 月 日	平 成 年 月 日	公費負担者番号							
保険薬局の住所及び名称 保険薬剤師氏名		印	公費負担医療の 受給者番号						

項目	検査結果	検査日	項目	検査結果	検査日	項目	検査結果	検査日
WBC	4.70	2020/09/10	ALT	29	2020/09/10	CK	91	2020/09/10
	4.90	2020/08/08		26	2020/08/08		90	2020/08/08
	4.85	2020/07/07		25	2020/07/07		89	2020/07/07
Neut/ μL	3.41	2020/09/10	γGT	155	2020/09/10	CRP	0.19	2020/09/10
	3.53	2020/08/08		152	2020/08/08		0.22	2020/08/08
	3.00	2020/07/07		154	2020/07/07		0.20	2020/07/07
HGB	12.6	2020/09/10	T-BIL	0.8	2020/09/10	K	3.7	2020/09/10
	12.5	2020/08/08		0.4	2020/08/08		3.8	2020/08/08
	12.1	2020/07/07		0.5	2020/07/07		3.8	2020/07/07
PLT	238	2020/09/10	CRE	0.71	2020/09/10	HbA1c NGSP	5.1	2020/09/10
	246	2020/08/08		0.78	2020/08/08		5.3	2020/08/08
	243	2020/07/07		0.77	2020/07/07		5.0	2020/07/07
AST	35	2020/09/10	eGFR	56.9	2020/09/10			
	37	2020/08/08		57.4	2020/08/08			
	36	2020/07/07		57.6	2020/07/07			



検査値QRコード



JAHIS準拠QRコード

※この二次元コードは処方情報ではなく、検査値情報を含む独自コードです  
旭川医大病院薬剤部HP: <http://www.asahikawa-med.ac.jp/hospital/pharmacy/>

マークは特殊インキで印刷してあるため、温度が上がると消色します。(マークをゆひで擦ったり、息を吹きかけたりして温めてください)